Calendrier

Mieux prescrire, moins prescrire

Qui sommes-nous ?

Un réseau de médecins **Généralistes Référents en Infectio Vigilance**
ExtraHospitalière dans la région Occitanie

Mieux prescrire, moins prescrire les antibiotiques.

@grive_occitanie

grive-occitanie.fr

Un Hic ? Antibiocllic !

ANTIBIOCLLIC est un outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, pour un bon usage des antibiotiques.

Son contenu suit les dernières recommandations françaises en vigueur, qui sont mises à jour régulièrement.

antibiocllic.fr

Janvier

1^{er}

2

3

4

5

6

7

grive-occitanie.fr

Généralités : Antibiothérapie

- les Fluoroquinolones
 - l'Amoxicilline-Acide clavulanique
- sont de potentiels dangers !

ÉPARGNONS LES !

- les Céphalosporines de 3ème génération orales

ÉVITONS-LES

Ces 3 classes d'antibiotiques ont le plus d'impact sur l'émergence de **bactéries multirésistantes**.

Janvier

8

9

10

11

12

13

14

grive-occitanie.fr

Infections respiratoires basses

Bronchite Aiguë

- **Virale** le plus souvent
- Expectoration purulente **ne signifie pas surinfection bactérienne.**
- La toux peut durer plusieurs semaines, notamment chez le fumeur.

Aucune antibiothérapie n'est nécessaire

Janvier

15

16

17

18

19

20

21

grive-occitanie.fr

Infections respiratoires basses

Exacerbation d'une bronchopneumopathie obstructive

L'antibiothérapie n'est pas systématique.

Elle doit tenir compte de **l'état respiratoire de BASE** du patient:

*pas de FQ dans les 6 mois précédents.

Janvier

22 _____

23 _____

24 _____

25 _____

26 _____

27 _____

28 _____

Infections respiratoires basses

Janvier

29 _____

30 _____

31 _____

Février

1^{er} _____

2 _____

3 _____

4 _____

Exacerbation d'une bronchopneumopathie obstructive

- L'argument clinique pour une origine bactérienne est la présence **d'une expectoration purulente verdâtre franche des crachats.**

- Toujours rechercher **d'autres causes à l'exacerbation** qu'une infection bactérienne.

Infections respiratoires basses

Diagnostic: **CLINIQUE ET RADIOLOGIQUE**

Février

- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____

Infections respiratoires basses

Pneumopathie aiguë communautaire adulte (<65ans)

Pneumocoque
(*Streptococcus pneumoniae*)

Amoxicilline (1gx3 pdt 7 jours)
= la molécule de référence

Bactéries dites atypiques
(notamment : *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumophila*).

Macrolides

- Les C3G orales sont exclues car insuffisamment actives sur pneumocoques et ont une mauvaise biodisponibilité.
- Les fluoroquinolones anti pneumococques (lévofloxacine) doivent être **utilisées avec prudence** :
 - Pas de prescription si FQ dans les 6 mois précédents
 - Eviter traitement par FQ anti pneumo répété chez le même patient
 - Eviter FQ anti pneumo en institution chez sujet âgé (transmission **croisée** de souches résistantes)

Février

12 _____

13 _____

14 _____

15 _____

16 _____

17 _____

18 _____

Vaccination antipneumococcique

Enfants >5ans et adultes à risque

Février

19	_____
20	_____
21	_____
22	_____
23	_____
24	_____
25	_____

Antibiotiques non recommandés quand :

Infections Respiratoires

Bronchiolites	Chez l'enfant sans facteur de risque, antibiothérapie inutile en première intention.
Bronchites aiguë	- Chez un enfant sans facteur de risque - Chez un adulte sain, sans pathologie respiratoire chronique ou sans co-morbidité.
Exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) <i>Chez l'adulte, le diagnostic de BPCO repose sur des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) effectuées en dehors de tout épisode d'exacerbation chez des sujets à risque de BPCO (tabac) et/ou devant une symptomatologie chronique (toux, exacerbation, dyspnée) et/ou devant des épisodes de bronchite aiguë à répétition.</i>	Devant une exacerbation chez un patient «BPCO» dont l'état en dehors de toute exacerbation est : - Une absence de dyspnée ou un VEMS >50% aux EFR - Une dyspnée d'effort ou un VEMS <50% aux EFR Si l'expectoration n'est pas franchement purulente verdâtre.

Février

26

27

28

29

Mars

1^{er}

2

3

4

Colonisation Urinaire ?

= bactériurie sans symptôme

« Pas de symptôme, pas de traitement ! »

Mars

5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____

grive-occitanie.fr

Colonisation Urinaire ?

Pas de seuil de bactériurie

(en dehors de la grossesse, où le seuil de bactériurie doit être $> 10^5$ UFC/mL).

**La leucocyturie ?
On ne s'en occupe pas!**

Mars

12 _____
13 _____
14 _____
15 _____
16 _____
17 _____
18 _____

grive-occitanie.fr

Colonisation Urinaire ?

2 exceptions... quand même :

La colonisation urinaire nécessite un dépistage et un traitement :

- À partir du 4^{ème} mois de grossesse
- Avant une procédure urinaire invasive programmée

Mars

19 _____
20 _____
21 _____
22 _____
23 _____
24 _____
25 _____

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

Les signes cliniques :

- Pollakiurie
- Dysurie
- Hématurie
- Douleur sus-pubienne
- Brûlures mictionnelles

Mars

26

27

28

29

30

31

1^{er}

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

« Docteur, mes urines sentent mauvais ! »

Pas de panique !

- ce n'est pas un signe clinique d'IU

Résistons à la prescription d'ECBU !

Avril

2

3

4

5

6

7

8

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

E. Coli responsable de **90%**
des IU communautaires.

Avril

9	_____
10	_____
11	_____
12	_____
13	_____
14	_____
15	_____

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

Le **tube boraté** : y penser pour le soir et le week-end. Il permet de conserver les urines **48h** à température ambiante.

Prélèvement

1

2

3

4

- Pour assurer une bonne conservation de l'échantillon d'urine, il est important de le transférer dans le tube de bactériologie dans les 15 min qui suivent le recueil.
- Après transfert de l'urine dans le tube, homogénéiser vigoureusement l'échantillon.

Avril

16

17

18

19

20

21

22

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

Si signes cliniques et ECBU:

- Leucocyturie $>$ ou $= 10^4$ GB/ml

et

- Bactériurie $>$ ou $= 10^4$ UFC/ml

Quel que soit l'âge ou le sexe

Avril

23

24

25

26

27

28

29

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

Cystite aiguë simple = **FOSFOMYCINE** en 1^{ère} intention

Et si c'est plus complexe: Ayons le réflexe!**Antibioclic!**

antibioclic.fr

Mai

30

1^{er}

2

3

4

5

6

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

Si IU masculine ou cystite à risque de complication bien tolérée:

Préférons un traitement différé !

pour adapter au mieux le traitement à l'antibiogramme

Mai

7

8

9

10

11

12

13

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

En cas d'évolution favorable d'une pyélonéphrite aiguë ou d'une IU masculine :

Pas besoin d'ECBU de contrôle !

Mai

14 _____
15 _____
16 _____
17 _____
18 _____
19 _____
20 _____

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

Le traitement d'une PNA simple n'est pas compliqué !

- ECBU obligatoire
- Antibiothérapie probabiliste pendant 48h-72h par ceftriaxone ou ciprofloxacine.
- Relais selon antibiogramme après un tour sur antibioticlic!

Mai

21 _____
22 _____
23 _____
24 _____
25 _____
26 _____
27 _____

grive-occitanie.fr

Infection urinaire

En cas de prescription de **Fluoroquinolones** dans les **6 derniers mois**, mieux **vaut éviter de les utiliser à nouveau** (risque de résistance).

Mai

28 _____

29 _____

30 _____

31 _____

Juin

1^{er} _____

2 _____

3 _____

Infection urinaire

Prévenir les infections :

- Eviter la constipation
- Bonne hydratation
- Trophicité des muqueuses
- Canneberge 36mg

Juin

4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____

grive-occitanie.fr

Antibiotiques non recommandés quand :

Infections Urinaires

Colonisation urinaire ou bactériurie asymptomatique

= situations de portage (présence de bactéries détectées à l'examen cyto bactériologique des urines sans que celles-ci ne génèrent de manifestations cliniques.)

Chez l'adulte, en dehors de la grossesse.

Juin

11

12

13

14

15

16

17

grive-occitanie.fr

Infections peau & tissus mous

Dermohypodermite non nécrosante = Érysipèle

Streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A

En 1^{ère} intention : **AMOXICILLINE**
1g à 1.5g 3 fois par jour, pendant 7 jours*

Évaluation clinique régulière des lésions

Traitement de la porte d'entrée

Mise à jour de la vaccination anti-tétanique

Contre-indication aux AINS

Pas d'anticoagulation systématique

En cas d'allergie à l'amoxicilline : clindamycine ou pristinamycine

* : Nouvelles
recommandations
2019 en cours de
parution.

Juin

18

19

20

21

22

23

24

grive-occitanie.fr

Infections peau & tissus mous

Impetigo : Staphylococcus aureus

Forme peu étendue

<2% de surface cutanée atteinte, ≤ 5 sites lésionnels actifs, pas d'extension rapide.

Antibiothérapie locale pendant 5 jours* :

ACIDE FUSIDIQUE crème ou pommade : 1 application 2 à 3 fois/jour
ou **MUPIROCINE** pommade : 1 application 2 à 3 fois/jour.

* : Nouvelles recommandations 2019 en cours de parution.

Jun

25

26

27

28

29

30

1^{er}

grive-occitanie.fr